

2016.04.

22-23.

MEGHÍVÓ

PSZICHÓZISOK ÉS AFFEKTÍV ZAVAROK

Az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI)
és a Krka közös rendezvénye

Bükkfűrdő, Greenfield Hotel

A rendezvény **14 kreditpontos.**



PROGRAM

PÉNTEK

2016. 04. 22

14³⁰
15⁰⁰

Megnyitó

Prof. Dr. Füredi János DSc. (Nyíró Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet) és Dr. Németh Attila PhD. (főigazgató főorvos, Nyíró Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet)

15⁰⁰
15⁴⁵

Dr. Németh Attila PhD. (főigazgató főorvos, Nyíró Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet):

A szkizofrénia kezelése a finanszírozási protokoll figyelembe vételével

15⁴⁵
16³⁰

Dr. Lőke János PhD. (főigazgató, Szent Borbála Kórház, Tatabánya):

Hogyan viszonyul egymáshoz a tapasztalat és number needed to treat?

16³⁰
17¹⁵

Dr. Kárpáti Róbert (centrumvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Pszichiátriai Centrum, Székesfehérvár):

Aripiprazol helye a szkizofrénia kezelésében

17¹⁵
17⁴⁵

Dr. Rónai Balázs (centrumvezető főorvos, Csolnoky Ferenc Kórház, Pszichiátriai Centrum, Sümeg):

Esetismertetés (pszichotikus beteg)

PROGRAM

SZOMBAT

2016. 04. **23**

09³⁰

10¹⁵

Dr. Szekeres György PhD. (osztályvezető főorvos, Nyíró Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet):
„Mit művel az agy, míg a gazda alszik?”

10¹⁵

11⁰⁰

Prof. Dr. Rihmer Zoltán (Széchényi díjas c. egyetemi tanár, az MTA doktora):
Antidepresszívum rezisztencia depresszióban - a bipolaritás markere?

11⁰⁰

11⁴⁵

Dr. Feller Gábor (osztályvezető főorvos, Pszichiátriai Osztály, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr):
A duloxetin helye az affektív spektrum zavaraiiban

11⁴⁵

12¹⁵

Dr. Payer Erzsébet (osztályvezető főorvos, Soproni Gyógyközpont, Pszichiátriai Osztály):
Esetismertetés (depressziós beteg)

12¹⁵

12³⁵

Zárómegbeszélés
(vezeti: Dr. Németh Attila és Dr. Feller Gábor).
Utána tesztvizsga

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE

BÜKFÜRDŐ, GREENFIELD HOTEL

IDŐPONT:


2016. április 22-23.

Cím:

9740 Bükfürdő, Golf út 4.

GPS KOORDINÁTÁK:

47.388657 16.7800815





Arisppa®
ariprazol
10 mg, 15 mg, 30 mg tableta

Még egy lépés a szkizofrénia kezelésében

Arisppa 10 mg tableta 10mg aripirazol, **Arisppa 15 mg tableta** 15mg aripirazol, **Arisppa 30 mg tableta** 30mg aripirazol tablettánként. Laktózt tartalmaz. **Jav:** Az Arisppa szkizofrénia kezelésére javallott, felnőttek és 15 éves vagy idősebb serdülők részére. Közepesen súlyos és súlyos mániás epizódok kezelésére javallott bipoláris affektív zavar I-es típusában, valamint új mániás epizód megelőzésére olyan felnőtteknél, akiknél túlymórnál mániás epizódok észlelhetők, és akiknél a mániás epizódja aripirazol-kezelésre reagált. Legfeljebb 12 hetes kezelésére javallott 13 éves vagy idősebb serdülők részére. **Adagolás és alkalmazás:** **Felnőttek:** Szkizofrénia: kezdő adag egyszer 10 vagy 15mg naponta, fenntartó adagja napi 15 mg, egyszer naponta, étkezéstől függetlenül. Napi 10 30mg dózistartományban hatásos. A napi 15mg-ot meghaladó adagoknál nem bizonyított a nagyobb mértékű hatékonyság, azonban egyes betegeknél a magasabb dózis hatásos lehet. A maximális napi adag nem haladhatja meg a 30 mg-ot. Mániás epizódok bipoláris affektív zavar I-es típusában: az Arisppa javasolt kezdő adagja naponta egyszer 15 mg, étkezéstől függetlenül, monoterápiaként vagy kombinált kezelésként. Néhány betegnél a magasabb dózis hatásos lehet. A maximális napi adag nem haladhatja meg a 30 mg-ot. Mániás epizód kiújulásának megelőzése bipoláris affektív zavar I-es típusában: azon betegek esetében, akik a mániás epizód kiújulásának megelőzésére aripirazolt kapnak monoterápiában vagy kombinált terápiaiban, a terápiát azonos adaggal kell folytatni. A napi adag módosítását, beleértve a dóziscsökkentést a klinikai állapot alapján kell mérlegelni. **Gyermekek:** 15 éves vagy idősebb szkizofréniaiban szenvedő serdülők: a javasolt adag naponta 10mg, napi egyszeri adagban, étkezéstől függetlenül alkalmazva. A kezelést két napig 2mg-mal kell kezdeni (1mg/ml-es aripirazol bőséges oldatot használva), további két napig 5mg-ra emelve, az ajánlott napi 10mg-os adag eléréséhez. Amennyiben szükséges, a következő dózisznöveléseket 5mg-os emelésekkel kell elvégezni, a napi maximális 30 mg-os adag túllépése nélkül. Nem javasolt 15 éves kor alatti szkizofrénias betegek számára, a biztonságosságra és hatásosságra vonatkozó adatok elégtelensége miatt. Mániás epizódok bipoláris affektív zavar I-es típusában, 13 éves vagy idősebb serdülőknél: javasolt adag naponta 10 mg, napi egyszeri adagolásban, étkezéstől függetlenül. A kezelést két napig 2 mg-mal kell kezdeni (1mg/ml-es aripirazol bőséges oldatot használva), további 2 napig 5mg-ra emelve, az ajánlott napi 10 mg-os adag eléréséhez. A serdülők számára a terápia megkezdésekor előírt dózis (naponta 2mg, 2 napig) nem biztosítható az Arisppa tableta alkalmazásával. Az Arisppa más megfelelő gyógyszerformája (pl. 1mg/ml bőséges oldat) nem áll rendelkezésre. Más, azonos hatóanyagot tartalmazó készítményt kell alkalmazni. A kezelést a tünetek kontrollálásához szükséges legrovidebb ideig kell folytatni és ez az időtartam nem haladhatja meg a 12 hetet. A napi 10 mg-os adagnál nagyobb adagok fokozott hatásosságra nem bizonyított, és a 30 mg-os napi adag alkalmazása a jelentős nemkívánatos hatások, többek között az extrapiramidális tünetekkel összefüggő események, az aluszékonyság, a fáradtság és a súlygyarapodás gyakoribb előfordulásával jár. Fiatalabb betegeknél nagyobb az aripirazollal összefüggő nemkívánatos események előfordulásának kockázata. Ezért az Arisppa alkalmazása 13 éves kor alatt nem javasolt. **Májkárosodásban szenvedő betegek:** Enyhe ill. közepes fokú májkárosodásban szenvedő betegeknél az adagolás módosítása nem szükséges. Súlyos májkárosodásban szenvedő betegeknél a rendelkezésre álló adatok nem elegendőek az adagolásra vonatkozó ajánlások felállításához. Ezeknél a betegeknél az adagolást körültekintően kell végezni. A maximális napi 30 mg-os adag alkalmazása körültekintést igényel súlyos májbetegségben szenvedő betegek esetében. **Idősek:** a kezelés hatásosságát szkizofréniaiban és a bipoláris affektív zavar I-es típusában 65 éves vagy idősebb betegeken nem állapították meg. Ezen betegcsoport nagyobb érzékenysége miatt, klinikailag indokolt esetben alacsonyabb kezdő dózis alkalmazása mérlegelendő. A tableta szájon át alkalmazandó. **Ellenjav:** A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. **Mellékhat:** nyugtalanság, álmatlanság, szorongás extrapiramidális zavarok, akathisia, remegés, szédülés, aluszékonyság, szédülő, fejfájás, homályos látás, dyspepsia, hányás, hányinger, székrekedés, fokozott nyáltermelés, fáradtság. **Ósztályozás:** II/2 csoport. Korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött, szakorvosi kórházi diagnózist követően folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszer (Sz). **Forg. eng. jog.:** Focus Care Pharmaceuticals B.V., Lagedijk 1-3, 1541 KA Koog aan de Zaan, Hollandia. **Alk. érv.:** 2015. február 5.

Készítmény megnevezése	Bruttó fogyasztói ár (Ft)	Kiemelt támogatás összeg (Ft)	Térítési díj kiemelt támogatás esetén (Ft)	Közgyógyon kiváltható-e
ARISPPA 10 mg tableta 60x	24 342	24 042	300	✓
ARISPPA 15 mg tableta 60x	23 402	23 102	300	✓
ARISPPA 30 mg tableta 30x	23 402	23 102	300	✓

Az árak 2016. április 1-től érvényesek. A mindenkorú árral kapcsolatos bővebb információkat az OEP honlapján - www.oep.hu - találhat. A vonatkozó indikációs pont (Eü. pont): 10/a3, 10/b4. **Bővebb információért olvassa el a gyógyszer teljes alkalmazási előírását vagy forduljon a gyártó magyarországi képviselőjéhez: Krka Magyarország Kft., 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 5. 1/3. Tel.: (1) 355 8490; Fax: (1) 214 9520.**



Krka Magyarország Kft.,
1036 Budapest, Pacsirtamező u. 5. 1/3.
Tel.: (1) 355 84 90 Fax: (1) 214 95 20
www.krka.co.hu